

Vergelijking van het gebruik van Pentobarbital en Natriumazide bij Hulp bij het Levenseinde (geldt niet voor de intraveneuze injectie met Thiopental bij Euthanasie).

Pentobarbital	Natriumazide
Voorafgaand aan de toediening	
Waarschuwing: niet enige tijd opioïden hebben gebruikt	idem
Nagaan of betrokkene zittend en snel 100ml kan drinken	onnodig
Familie voorbereiden op snurken, etc.	Vorbereiden op een normaal stervensproces
Antibraakmiddel Metoclopramide: 12 uur tevoren 1; 6 uur tevoren 1; 1 uur tevoren 1 (kans op braken minimaliseren)	Antibraakmiddel Domperidon (werkzaam binnen 15 – 30 minuten): 5 uur tevoren 1; 3 uur tevoren 1; 1 uur tevoren 2 met 2 paracetamol (kans op braken en op hoofdpijn minimaliseren). Het risico op enige epileptische activiteit of trekkingen is te voorkomen met 40 mg. Valium 20 minuten voor de inname van de Natriumazide.
Toediening	
Oraal 15 gram pentobarbital in 100 ml	Oraal 3 capsules met in totaal 3 gram Natriumazide (ver boven de letale dosis van 1,5 gram)
Snel opdrinken om braken te voorkomen	Rustig innemen
Vieze smaak: bitter-zeperig, kans op braken, eventueel wordt niet de hele dosis opgenomen	Smakeloos, gehele dosis wordt opgenomen
Na het innemen binnen 5-10 minuten in slaap	Idem
Tijdsduur tot overlijden varieert van 30 minuten tot 2-3 uur ¹	Idem
Noodset euthanatica voor intraveneus gebruik (bij een langer durend stervensproces)	Is voor Natriumazide aan te bevelen
Opmerking (en persoonlijke mening Wim van Dijk)	
De intraveneuze toediening van Thiopental is snel en barmhartig en verdient verreweg de voorkeur boven de orale toedieningen	

Advies in de KNMG-richtlijn: "We adviseren u met de patiënt en de familie een maximale tijdsduur van 1 à 2 uur tot overlijden af te spreken. Als de patiënt dan niet is overleden, gaat u alsnog over op euthanasie, intraveneuze toediening van de euthanatica". WvD: Dat betekent dat mogelijk de tijdsduur van overlijden langer zou zijn geweest zonder de intraveneuze toediening.